

ИНСТРУКЦИЯ

Сиалис

Торговое название: Сиалис. **Международное (непатентованное) название:** Тадалафил (Tadalafil).

Лекарственная форма и назначение: Таблетки для применения внутрь.

Состав на 1 таблетку

Активное вещество: Тадалафил – 20- 40 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кроскармеллоза натрия, гидроксипропил целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, смесь красителя Опадри II, тальк.

Фармакотерапевтическая группа: Эректильной дисфункции средство лечения, ФДЭ-5 ингибитор.

Показания к применению

Нарушения эрекции.

Противопоказания

Установленная повышенная чувствительность к тадалафилу или к любому веществу, входящему в состав препарата. В случае приема препаратов, содержащих любые органические нитраты. Применение у лиц до 18 лет.

Предупреждения

Сексуальная активность имеет потенциальный риск для пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями. Поэтому лечение эректильной дисфункции, в том числе с использованием препарата СИАЛИС, не следует проводить у мужчин с такими заболеваниями сердца, при которых сексуальная активность не рекомендована. СИАЛИС следует с осторожностью применять у пациентов при серповидноклеточной анемии, множественной миеломе или лейкемии, и ли у пациентов с анатомической деформацией полового члена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сиалис можно принимать с другими лекарственными средствами только в том случае, если это рекомендовано врачом. Сиалис может вызвать нежелательное усиление действия лекарственных препаратов, которые называют нитратами и донаторами окиси азота.

Передозировка

Только врач может решить, в какой дозировке вам следует принимать Сиалис. Для большинства мужчин это не превышать дозу 20 мг в сутки

Способ применения и дозы

Рекомендованная доза препарата СИАЛИС составляет 10-20 мг.

СИАЛИС принимают перед предполагаемой сексуальной активностью независимо от приёма пищи. Препарат следует принимать как минимум за 30 минут до предполагаемой сексуальной активности. Пациенты могут осуществлять попытку полового акта в любое время в течение 36 часов после приёма препарата. Скорость и степень всасывания тадалафила не зависят от приема пищи

Побочное действие

Являются головная боль и диспепсия. Нежелательные события, связанные с приёмом тадалафила, были обычно незначительными или средними по степени выраженности, и уменьшались при продолжении применения препарата. Другими обычными нежелательными эффектами являлись боль в спине, миалгия, заложенность носа и "приливы" крови к лицу

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 30 градусов С в оригинальной упаковке. Хранить в местах недоступных для детей

Срок годности. 2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке

Меры предосторожности

Пациентам с тяжёлой печёночной недостаточностью препарат назначается с осторожностью.