

ИНСТРУКЦИЯ Женская Виагра

Торговое название: Женская Виагра. **Международное (патентованное) название:** Силденафил (Sildenafil) Generic Female Viagra.

Лекарственная форма и назначение: Таблетки Виагры для женщин принимаются внутрь.

Состав на 1 таблетку

Действующее вещество: силденафил - 50 мг или 100 мг (в виде силденафила цитрата); неактивные компоненты: Микрокристаллическая целлюлоза, кальция гидрофосфат (безводный), натрия кроскармеллоза, магния стеарат, гипромеллоза, титана двуокись (E171), лактоза, триацетин, индиго кармин алюминиевый лак (E132)

Фармакологическое действие: Джeneric Женской Виагры эффективен для восстановления физиологических особенностей (смазки, усиления чувствительности клитора, набухания половых губ) при сексуальном возбуждении без привыкания и зависимости. Он усиливает удовольствие от полового акта и силу оргазма. У большинства женщин, испытывавших трудности при достижении оргазма, появляются новые положительные эмоции от интимной близости. Особенно это верно в том случае, если до приема препарата у женщины отмечались неприятные, либо болезненные ощущения во время полового акта. Проводились тестирования среди женщин в возрасте до 41 года, перенесших операцию по удалению матки, принимающих препарат. 90% участниц тестов отметили повышенный тонус мышц влагалища и уровень приятных ощущений после приема Джeneric. Более 50% отметили нормализацию и интенсивность своих оргазмов. Силденафил, находящийся в составе препарата, усиливает кровоток в сосудистой системе малого таза и способствует кровенаполнению малых половых губ и клитора женщины, также обеспечивая влагалище смазкой. Таким образом, женщина даже в период менопаузы может полностью насладиться занятием любовью, получая усиленные оргазмы, потому как снимаются болезненность и сухость влагалища при половом сношении.

Показания к применению

Повышение сексуальности, усиление чувствительности к стимуляции.

Противопоказания

- параллельный прием лекарственных препаратов – кетоконазола, эритромицина, циметидина и итраконазола (а в сочетании с ритонавиром и саквинавиром, дозировка Джeneric должна быть снижена до 25мг; смертельно опасно одновременное применение силденафила с препаратами, содержащими нитраты; во время беременности и предшествующим ей периоде; при тяжелых формах стенокардии, при гипер- и гипотензии, перенесенных инфаркте миокарда, инсульте (в последние 6 месяцев), острой почечной недостаточности, пигментном ретините. Силденафила цитрат может оказывать негативное воздействие на организм при миоме матки. Перед началом применения препарата желательно проконсультироваться с врачом!!!

Способ применения и дозы

Джeneric Женская Виагра принимается перорально за 30-40 минут до совершения полового акта. Эффект от препарата длится до 6 часов. Рекомендуемую дозу 50мг принимают при необходимости примерно за один час до планируемой сексуальной активности. С учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 100мг или снижена до 25мг. Максимальная рекомендуемая доза составляет 100мг. Максимальная рекомендуемая частота применения – один раз в день.

Побочное действие

Наиболее частыми побочными эффектами являются сердечно-сосудистые – головная боль, приливы, головокружение; пищеварение – диспепсия; дыхание – заложенность носа; органы чувств – изменение зрения (легкое и преходящее, главным образом изменение цвета объектов, а также усиленное восприятие света и нарушение четкости зрения)

Условия хранения

Хранить ВИАГРУ при температуре ниже 30°C в заводской упаковке. Как и все препараты, храните ВИАГРУ в недоступном для детей месте. Не принимайте препарат с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.